

成都实验外国语学校 2016-2017 学年上期期中考试

九年级数学学科试题

一、选择题

1、B 2、D 3、A 4、B 5、B 6、C 7、C 8、A 9、A 10、D

二、填空题

11、 $k = -1$ 12、 $k < -1$ 13、 $\frac{12}{5}$ 14、(1) (9, 0) (2) 1 : 2

三、解答题

15、(1)解：由题意可得：

$$x^2 + 8x - 9 = 0$$

$$x^2 + 8x + 16 - 16 - 9 = 0$$

$$(x + 4)^2 = 25$$

$$x + 4 = \pm 5$$

$$\therefore x_1 = 1, \quad x_2 = -9$$

(3)解：由题意可得：


$$(7x - 3)(5x + 2) = 0$$

$$\therefore x_1 = \frac{3}{7}, \quad x_2 = -\frac{2}{5}$$

16、解：由题意可得： $x_1 + x_2 = -\frac{3}{2}$, $x_1 x_2 = -\frac{1}{2}$

$$\therefore (1) x_1^2 x_2 + x_2^2 x_1 = x_1 x_2 (x_1 + x_2) = \left(-\frac{1}{2}\right) \times \left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{4};$$

$$(2) x_1^2 + x_2^2 = x_1^2 + 2x_1 x_2 + x_2^2 - 2x_1 x_2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = \left(-\frac{3}{2}\right)^2 - 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{13}{4}$$



17、解：(1)如图所示

(2) ∵ 点 N 、 F 到路灯的底部的距离相等，
 $\therefore \angle N = \angle F$ ， $\therefore PM \perp NF$ ， $DE \perp NF$ ，
 $\therefore \angle PMN = \angle DEF = 90^\circ$ $\therefore \triangle PMN \sim \triangle DEF$ ，
 ∵ 小明身高 1.6 米，影长 EF 为 1.8 米，树的影长 MN 是 6 米，
 $\therefore \frac{DE}{PM} = \frac{EF}{MN}$ ，即 $\frac{1.6}{PM} = \frac{1.8}{6}$ ，解得： $PM = \frac{16}{3}$ （米）。

18、解：(1) 如图，用表格列出的所有可能结果为：

	2	3	5
1	(2, 1)	(3, 1)	(5, 1)
3	(2, 3)	(3, 3)	(5, 3)

由图可知在 (a, b) 中使得 $a \leq b$ 的概率为： $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 。

(2) 由题意可得： $a^2 - 8b > 0$ ， $\therefore a^2 > 8b$ 。

\therefore 在 (a, b) 中使关于 x 的一元二次方程 $x^2 - ax + 2b = 0$ 有两个不等实根的概率为：

$$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}。$$

19、解：由题意可得：

(1) ∵ 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象在二、四象限，

$$\therefore k < 0, \quad \therefore S_{\triangle ABO} = \frac{1}{2}|k| = \frac{3}{2}; \quad \therefore k = -3$$

\therefore 双曲线 $y = \frac{k}{x}$ 的解析式为： $y = -\frac{3}{x}$ ；

直线 $y = -x - (k+1)$ 的解析式为： $y = -x - (-3+1)$ ，即

$$y = -x + 2;$$

(2) ∵ 把一次函数与反比例函数的解析式组成方程组，得：

$$\begin{cases} y = -x + 2 \\ y = -\frac{3}{x} \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} x_1 = -1 \\ y_1 = 3 \end{cases}, \begin{cases} x_2 = 3 \\ y_2 = -1 \end{cases}, \quad \therefore A(-1, 3), C(3, -1)$$


\therefore 一次函数的解析式为： $y = -x + 2$ ，

\therefore 令 $y = 0$ ，则 $-x + 2 = 0$ ，即 $x = 2$ ，

\therefore 直线 AC 与 x 轴的交点 $D(2, 0)$

$\therefore A(-1, 3), C(3, -1)$

$$\therefore S_{\triangle AOC} = S_{\triangle AOD} + S_{\triangle COD} = \frac{1}{2} \times 2 \times (3+1) = 4;$$



(3) $\because A(-1, 3), C(3, -1)$

\therefore 当 $x < -1$ 或 $0 < x < 3$ 时，一次函数的值大于反比例函数的值。


20、解：(1) 由题意可得： $\because x^2 - 7x + 12 = 0$ ， \therefore 解得： $x_1 = 3, x_2 = 4$ 。

$\because OA < OB$ ， $\therefore OA = 3, OB = 4$ 。 $\therefore A(0, 3), B(4, 0)$ 。

(2) 由 $OA = 3, OB = 4$ ，根据勾股定理，得 $AB = 5$ 。


由题意可得， $AP = t, AQ = 5 - 2t$ 。分两种情况讨论：

① 当 $\angle APQ = \angle AOB$ 时，如图 1



$\triangle APQ \sim \triangle AOB$ 。 $\therefore \frac{AP}{AO} = \frac{AQ}{AB}$ ，即 $\frac{t}{3} = \frac{5-2t}{5}$ ，解得： $t = \frac{15}{11}$ 。 $\therefore Q(\frac{20}{11}, \frac{18}{11})$


② 当 $\angle AQP = \angle AOB$ 时，如图 2，



$\triangle APQ \sim \triangle ABO$ 。 $\therefore \frac{AP}{AB} = \frac{AQ}{AO}$ ，即 $\frac{t}{5} = \frac{5-2t}{3}$ ，解得： $t = \frac{25}{13}$ 。 $\therefore Q(\frac{12}{13}, \frac{30}{13})$ 。

(3) 存在。 $M_1(\frac{4}{5}, \frac{22}{5})$ ， $M_2(\frac{4}{5}, \frac{2}{5})$ ， $M_3(-\frac{4}{5}, \frac{8}{5})$

当 $t = 2$ 时，如图，



$$OP=2, BQ=4, \therefore P(0, 1), Q\left(\frac{4}{5}, \frac{12}{5}\right).$$

若以 A、P、Q、M 为顶点的四边形是平行四边形，则：

①当 AQ 为对角线时，点 M_1 的横坐标与点 Q 的横坐标相同，纵坐标为 $\frac{12}{5} + 2 = \frac{22}{5}$ 。

$$\therefore M_1\left(\frac{4}{5}, \frac{22}{5}\right);$$

②当 PQ 为对角线时，点 M_2 的横坐标与点 Q 的横坐标相同，纵坐标为 $\frac{12}{5} - 2 = \frac{2}{5}$ 。

$$\therefore M_2\left(\frac{4}{5}, \frac{2}{5}\right);$$

③当 AP 为对角线时，点 Q、 M_3 关于 AP 的中点对称。

由 A(0, 3), P(0, 1) 得 AP 的中点坐标为 (0, 2);

由 $Q\left(\frac{4}{5}, \frac{12}{5}\right)$ 得 M_3 的横坐标为 $2 \times 0 - \frac{4}{5} = -\frac{4}{5}$ ，纵坐标为 $2 \times 2 - \frac{12}{5} = \frac{8}{5}$ 。

$$\therefore M_3\left(-\frac{4}{5}, \frac{8}{5}\right).$$

综上所述，若以 A、P、Q、M 为顶点的四边形是平行四边形，则 M 点的坐标为：

$$\left(\frac{4}{5}, \frac{22}{5}\right) \text{ 或 } \left(\frac{4}{5}, \frac{2}{5}\right) \text{ 或 } \left(-\frac{4}{5}, \frac{8}{5}\right).$$

B 卷

21. 0、1

解析：

\therefore 关于 x 的方程 $x^2 - 3x + 2k - 1 = 0$ 有实数根，

$$\therefore \Delta = 9 - 4(2k - 1) \geq 0, \text{ 解得 } k \leq \frac{13}{8},$$

\therefore 反比例函数 $y = \frac{1+2k}{x}$ 的图象在各自象限内 y 随 x 增大而减小，

$$\therefore 1+2k > 0, \text{ 解得 } k > -\frac{1}{2},$$


$$\therefore -\frac{1}{2} < k \leq \frac{13}{8},$$

\therefore 满足上述条件的 k 的整数值为 0, 1.

故答案为：0, 1.

22. 6

解析：连接 BD, DE,



∵ 四边形 ABCD 是正方形，

∴ 点 B 与点 D 关于直线 AC 对称，

∴ DE 的长即为 BQ+QE 的最小值，

$$\therefore DE = BQ + QE = \sqrt{AD^2 + AE^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5,$$

∴ $\triangle BEQ$ 周长的最小值 $= DE + BE = 5 + 1 = 6$.

故答案为：6.

23.200

解析：根据三视图可得：上面的长方体长 4mm，高 4mm，宽 2mm，

下面的长方体长 6mm，宽 8mm，高 2mm，

∴ 立体图形的表面积是： $4 \times 4 \times 2 + 4 \times 2 \times 2 + 4 \times 2 \times 2 + 6 \times 2 \times 2 + 8 \times 2 \times 2 + 6 \times 8 \times 2 - 4 \times 2 = 200$ (mm²).

故答案为：200.

24. $\left(-\frac{3^n}{2^n}, \frac{3^n}{2^{n+1}}\right)$

解析：

解：∵在第二象限内，将矩形AOCB以原点O为位似中心放大为原来的 $\frac{3}{2}$ 倍，

∴矩形 $A_1OC_1B_1$ 与矩形AOCB是位似图形，点B与点 B_1 是对应点，

∴ $OA=2$ ， $OC=1$ ，

∴点B的坐标为 $(-2, 1)$ ，

∴点 B_1 的坐标为 $(-2 \times \frac{3}{2}, 1 \times \frac{3}{2})$ ，

∴将矩形 $A_1OC_1B_1$ 以原点O为位似中心放大 $\frac{3}{2}$ 倍，得到矩形 $A_2OC_2B_2$ ，

∴ $B_2(-2 \times \frac{3}{2} \times \frac{3}{2}, 1 \times \frac{3}{2} \times \frac{3}{2})$ ，

∴ $B_n(-2 \times \frac{3^n}{2^n}, 1 \times \frac{3^n}{2^n})$ ，

∴矩形 $A_nOC_nB_n$ 的对角线交点 $(-2 \times \frac{3^n}{2^n} \times \frac{1}{2}, 1 \times \frac{3^n}{2^n} \times \frac{1}{2})$ ，即 $(-\frac{3^n}{2^n}, \frac{3^n}{2^{n+1}})$ ，

故答案为： $(-\frac{3^n}{2^n}, \frac{3^n}{2^{n+1}})$ 。

25. (1) -2; (2) $3\sqrt{2}$

解：(1) 设点P的坐标为 (m, n) ，则点Q的坐标为 $(m-1, n+2)$ ，

依题意得：
$$\begin{cases} n=km+b \\ n+2=k(m-1)+b \end{cases}$$

解得： $k=-2$ 。

故答案为：-2。

(2) ∵ $BO \perp x$ 轴， $CE \perp x$ 轴，

∴ $BO \parallel CE$ ，

∴ $\triangle AOB \sim \triangle AEC$ 。

又∵ $\frac{S_1}{S_2} = \frac{7}{9}$ ，

∴ $\frac{S_{\triangle AOB}}{S_{\triangle AEC}} = \frac{9}{7+9} = \frac{9}{16}$ 。

令一次函数 $y=-2x+b$ 中 $x=0$ ，则 $y=b$ ，

∴ $BO=b$ ；

令一次函数 $y=-2x+b$ 中 $y=0$ ，则 $0=-2x+b$ ，

解得： $x=\frac{b}{2}$ ，即 $AO=\frac{b}{2}$ 。

∵ $\triangle AOB \sim \triangle AEC$ ，且 $\frac{S_{\triangle AOB}}{S_{\triangle AEC}} = \frac{9}{16}$ ，

∴ $\frac{AO}{AE} = \frac{BO}{CE} = \frac{3}{4}$ 。

$$\therefore AE = \frac{4}{3}AO = \frac{2}{3}b, CE = \frac{4}{3}BO = \frac{4}{3}b, OE = AE - AO = \frac{1}{6}b.$$

$$\therefore OE \cdot CE = |-4| = 4, \text{ 即 } \frac{2}{9}b^2 = 4,$$

$$\text{解得: } b = 3\sqrt{2}, \text{ 或 } b = -3\sqrt{2} \text{ (舍去).}$$

$$\text{故答案为: } 3\sqrt{2}.$$

26. 12

解：设 BC 边的长为 x 米，

$$\text{则 } AB = CD = \frac{32-x}{2} \text{ 米，}$$

根据题意得：

$$\frac{32-x}{2} \times x = 120,$$

$$\text{解得: } x_1 = 12, x_2 = 20,$$

$$\because 20 > 16,$$

$$\therefore x_2 = 20 \text{ 不合题意, 舍去,}$$

$$\text{故答案为: } 12.$$

27.

解：（1） $\because BM \perp MN$,

$$\therefore \angle BMN = 90^\circ, \text{ 即 } \angle BMO + \angle AMN = 90^\circ,$$

$$\because \angle BMO + \angle OBM = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle AMN = \angle OBM,$$

$$\because \text{正方形 } OBCA \text{ 中, } \angle BOM = \angle MAN = 90^\circ,$$

$$\therefore Rt\triangle BOM \sim Rt\triangle MAN;$$

$$(2) \because \triangle BOM \sim \triangle MAN,$$

$$\therefore \frac{BO}{MA} = \frac{OM}{AN},$$

$$\because A(4, 0), \text{ 正方形 } OBCA,$$

$$\therefore OB = OA = 4,$$

$$\because OM = x,$$

$$\therefore AM = 4 - x,$$

$$\because C_{\triangle BOM} : C_{\triangle MAN} = 4 : 3$$

$$\therefore \frac{4}{4-x} = \frac{4}{3}$$

$$\text{解得: } x = 1$$

$$\therefore OM = 1$$

$$\therefore \frac{OM}{AN} = \frac{4}{3},$$

$$\therefore \frac{1}{AN} = \frac{4}{3},$$

$$\text{解得: } AN = \frac{3}{4},$$

$\therefore N$ 点的坐标为 $(4, \frac{3}{4})$.

(3) $\because \angle AOM = \angle BMN = 90^\circ$

要使 $\triangle BOM \sim \triangle BMN$, 则有

$$\frac{BM}{MN} = \frac{BO}{AM}$$

由 (1) 知: $\frac{BM}{MN} = \frac{OB}{CM}$

$$\text{即, } \frac{BO}{AM} = \frac{OB}{CM}$$

$\therefore AM = CM$

\therefore 当点 M 运动到 OA 的中点时, $\triangle BOM \sim \triangle BMN$, 此时 $x=2$.
28.

(1) 如图 2, 连接 OP .

$$S_{\triangle PAB} = S_{\triangle PAO} = 12xy = 12 \times 6 = 3;$$

(2) ① 如图 1, \because 四边形 $BQNC$ 是菱形,

$$\therefore BQ = BC = NQ, \angle BQC = \angle NQC,$$

$\because AB \perp BQ$, C 是 AQ 的中点,

$$\therefore BC = CQ = \frac{1}{2} AQ,$$

$$\therefore \angle BQC = 60^\circ, \angle BAQ = 30^\circ,$$

在 $\triangle ABQ$ 和 $\triangle ANQ$ 中,

$$BQ = NQ$$

$$\angle BQA = \angle NQA$$

$$QA = QA,$$

$$\therefore \triangle ABQ \cong \triangle ANQ (SAS),$$

$$\therefore \angle BAQ = \angle NAQ = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle BAO = 30^\circ,$$

$$\because S_{\text{菱形 } BQNC} = 2\sqrt{3} = 12 \times CQ \times BN,$$

$$\text{令 } CQ = 2t = BQ, \text{ 则 } BN = 2 \times (2t \times \frac{\sqrt{3}}{2}) = 2\sqrt{3}t,$$

$$\therefore t = 1$$

$$\therefore BQ = 2,$$

\because 在 $Rt\triangle AQB$ 中, $\angle BAQ = 30^\circ$,

$$\therefore AB = \sqrt{3}BQ = 2\sqrt{3},$$

$$\therefore \angle BAO = 30^\circ$$

$$\therefore OA = \frac{\sqrt{3}}{2} AB = 3,$$

又 $\because P$ 点在反比例函数 $y = \frac{6}{x}$ 的图象上,

$\therefore P$ 点坐标为 $(3, 2)$,

$\therefore \triangle ABQ \cong \triangle ANQ$,

$\therefore \angle ANQ = \angle ABQ = 90^\circ$, $AN = AB = 2\sqrt{3}$,

$\therefore MN \parallel OA$,

$\therefore \angle BMQ = 90^\circ$,


$\therefore \angle BAO = 30^\circ$, $\angle AOB = 90^\circ$,

$\therefore \angle ABO = 60^\circ$,

$\therefore \angle MBQ = 30^\circ$,

$$\therefore MQ = \frac{1}{2} BQ = \frac{1}{2} \times 2 = 1,$$

$\therefore OM = AN = 2\sqrt{3}$,



$\therefore Q(1, 2\sqrt{3})$; 图3

②如图3, 作直线 PQ , 交 y 轴于 E 点, 此时 $|EQ - QP|$ 值最大;

设直线 PQ 的解析式为 $y = kx + b$,

$\therefore P(3, 2), Q(1, 2\sqrt{3})$,

$$\therefore \begin{cases} 3k + b = 2 \\ k + b = 2\sqrt{3} \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} k = 1 - \sqrt{3} \\ b = 3\sqrt{3} - 1 \end{cases}$$

\therefore 直线 PQ 的解析式为 $y = (1 - \sqrt{3})x + 3\sqrt{3} - 1$,

令 $x = 0$, 则 $y = 3\sqrt{3} - 1$,

$\therefore E(0, 3\sqrt{3} - 1)$.